



Prise en charge de l'ARRET Cardio-

Les Signes



- **ABSENCE DE CONSCIENCE**
- **ABSENCE DE RESPIRATION SPONTANÉ OU GASP**

Voir fiche sur la prise en charge de l'inconscient pour les signes

Prise en charge

- **ALERTER ET APPELER À L'AIDE**
- **COMMENCER IMMÉDIATEMENT LES COMPRESSIONS THORACIQUES EN CONTINUE**
- **RAPPROCHER LE CHARIOT D'URGENCE**
- **POSE DU DÉFIBRILATEUR**
- **POSE DE LA PLANCHE À MASSER SI NÉCESSAIRE**
- **CONTINUER LA RÉANIMATION**

Alténer 30 compressions thoraciques pour 2 insufflations au BAVU entre les analyses du DSA




A partir de la 2ème analyse, si
pas de choc
recommandé, vérifier si présence
d'une respiration spontanée et
d'un pouls

Prise en charge avancée

Si 3 personnes présentes

- **POSE D'UNE VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE**
avec NaCl 0.9%
- **PRÉPARATIONADRÉNALINE 1MG/ML**
seringue de 5ml
- **PRÉPARATION AMIODARONE 300MG**
- **SORTIR LE MATÉRIEL D'INTUBATION ET D'ASPIRATION**
- **CONSTANTES ET ECG**



Continuer la réanimation jusqu'à
l'arrivée de l'équipe médicale ou
jusqu'à la reprise d'une
respiration